


Мастенит[®] **NEW**

Клоксациллин

Суспензия для интрацистернального применения

Уверенная защита


АНТИМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОРОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БОЛЕЕ 7 НЕДЕЛЬ





Мастенит®

Уверенная защита




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действует весь сухостойный период
- Широкий спектр активности, в том числе против штаммов, резистентных к пенициллину
- Эффективно работает в тканях вымени

ОПИСАНИЕ

Антимаститный препарат для коров в период сухостоя с защитным действием более 7 недель. По внешнему виду препарат представляет собой густую суспензию от белого до светло-серого цвета. Мастенит выпускают расфасованным по 3,6 г в полимерные шприцы с канюлей для интрацистернального введения, укупоренные защитными колпачками. Защитный колпачок состоит из верхней и нижней частей для получения канюли различной длины. Каждый шприц снабжен стерильной спиртовой салфеткой и инструкцией по применению препарата.

СОСТАВ



Для точного расчета необходимого объема препарата Мастенит® воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте WWW.NITA-FARM.RU

УПАКОВКА



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ




Пролонгированная форма клоксациллина позволяет обеспечить защиту вымени на весь сухостойный период – **более 7 недель**

Мастенит действует на всех клинически значимых возбудителей мастита в период сухостоя.

Streptococcus agalactiae	Streptococcus uberis	Streptococcus pyogenes	Streptococcus disgalactiae	Staphylococcus aureus	Corynebacterium spp.
+	+	+	+	+	+

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАСТЕНИТ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАСТИТОВ*



Исследования эффективности применения Мастенит с целью недопущения развития маститов в послеотельный период показали, что однократное применение препарата непосредственно перед запуском в **90%** случаев позволяет избежать возникновения маститов у коров после отёла.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА



5 суток
после отёла



28 суток
после введения препарата

В случае ошибочного введения препарата лактирующим животным, или если отёл произошел ранее чем через 42 дня после введения препарата, молоко можно использовать через 46 суток после введения препарата Мастенит.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства. После вскрытия первичной упаковки – хранению не подлежит.

* МНИЦ ОЗОС «Изучение терапевтической и профилактической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения Мастенит» на КРС

ПОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ


Мастенит применяют однократно перед переводом на сухостойный период, непосредственно перед запуском.

СХЕМА ВВЕДЕНИЯ МАСТЕНИТ




1

Перед применением препарата Мастенит необходимо полностью выдоить молоко из вымени



2

Сосок снаружи протирают антисептической салфеткой, идущей в комплекте с препаратом Мастенит



3

Снимают крышку с канюли шприца



4

Канюлю шприца вводят в отверстие соска и, осторожно надавливая на поршень, вводят лекарственный препарат



5

В каждую четверть вымени вводят содержимое 1 шприца



6

Вымя защищено от маститов на весь сухостойный период

**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О ПРОДУКТАХ НА САЙТЕ
КОМПАНИИ**

для перехода на страницу продукта
отсканируйте QR-код



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

ANIMALPROFI



WWW.ANIMAL-PROFI.RU